

## MOCNE I SŁABE STRONY WYKSZTAŁCENIA MATEMATYCZNEGO MATURZYSTÓW

Egzamin maturalny z matematyki ma znowu szansę stać się egzaminem obowiązkowym dla polskich maturzystów. W 2002 roku ówczesna minister edukacji zniosła obowiązek zdawania matematyki na „nowej” maturze, mimo iż rektorzy uczelni technicznych od lat zwracali uwagę na ucieczkę studentów od wymagających wysiłku umysłowego przedmiotów ścisłych. Podobnie raporty OECD również pokazywały, że polscy uczniowie czuli się bezradni wobec najprostszych problemów matematycznych. Ten stan rzeczy potwierdziły także wyniki kolejnych egzaminów maturalnych z matematyki. Zdający zazwyczaj potrafili zastosować dobrze znane algorytmy w typowym kontekście, ale mieli kłopoty z tym, co nazywamy myśleniem twórczym, z analizą problemów i interpretacją otrzymanych wyników. Większość maturzystów nie potrafiła samodzielnie zaplanować strategii rozwiązania bardziej złożonych matematycznie problemów. Nie umiała formułować własnych hipotez i ich uzasadniać. Obecnie matematyka postrzegana jest przez większość uczniów jako przedmiot trudny, oderwany od rzeczywistości, pełny nieprzydatnych w życiu codziennym definicji i twierdzeń. A przecież nowoczesność w nauczaniu matematyki polega między innymi na tzw. upraktycznieniu rozwiązywanych problemów. Matematyka uczy logicznego myślenia i dyscypliny umysłowej, ale również przygotowuje do samodzielnego rozwiązywania problemów, pozyskiwania wiedzy i sprawnego podejmowania decyzji. Obok zadań typu *oblicz, wyznacz, rozwiąż* na egzaminie maturalnym, ale i w praktyce szkolnej, pojawiają się również polecenia *sprawdź, porównaj, przedstaw, zaznacz, wybierz, uzasadnij*. Formułujemy zadania, w tym zadania praktyczne, które uczą modelowania matematycznego, tworzenia strategii rozwiązania problemu, argumentowania i interpretowania otrzymanych wyników, pojawiają się zadania budowane w oparciu o zbieranie i analizowanie informacji.

W maju 2009 roku do matury z matematyki przystąpiło 76900 osób i jak pokazują statystyki z lat 2005-2009 popularność matematyki na egzaminie maturalnym corocznie maleje.

Tegoroczne zadania egzaminacyjne badały znajomość i rozumienie podstawowych pojęć matematycznych, definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się tą wiedzą w praktyce. Sprawdzały także umiejętność analizowania i interpretowania problemów matematycznych oraz formułowania opisu matematycznego danej sytuacji, a także argumentowania i prowadzenia rozumowania matematycznego. Zadania w arkuszach z obu poziomów badały umiejętności opisane we wszystkich trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych. W arkuszu z poziomu podstawowego zdający mógł uzyskać 36 punktów za umiejętności opisane w II standardzie (korzystanie z informacji) oraz po 7 punktów za umiejętności opisane w I i III standardzie (odpowiednio – wiadomości i rozumienie oraz tworzenie informacji). Za rozwiązania zadań w arkuszu z poziomu rozszerzonego zdający mógł uzyskać 25 punktów za umiejętności opisane w II standardzie wymagań egzaminacyjnych, 19 punktów za umiejętności opisane w III i 6 punktów za umiejętności opisane w I standardzie. Wiadomości i umiejętności zostały zbadane na treściach wszystkich dziewięciu działów podstawy programowej z matematyki dla zakresu podstawowego i dziesięciu działów podstawy programowej dla zakresu rozszerzonego.

Odpowiedzi zdających wskazują na zróżnicowany poziom opanowania wiadomości i umiejętności matematycznych, które powinien posiadać uczeń kończący szkołę pogimnazjalną. Zdający osiągnęli wysokie wyniki, rozwiązując zadania sprawdzające podstawowe wiadomości i typowe umiejętności, często kształcone już w gimnazjum. Należą do nich: wyznaczanie wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowego, rysowanie wykresu funkcji liniowej i odczytywanie własności funkcji z wykresu (zadanie 1 pp). Potwierdzają to także wyniki z poziomu rozszerzonego. Zdający potrafili wykorzystać pojęcia argumentu i wartości funkcji i zinterpretować otrzymane wyniki, aby uzasadnić przynależność punktu do wykresu funkcji (zadanie 1 pr). Nieco trudniejszą umiejętnością w tym zadaniu okazało się narysowanie w układzie współrzędnych zbioru opisanego układem warunków. Maturzyści umieli także wykorzystać definicję funkcji wykładniczej i narysować wykres funkcji typu  $g(x) = |f(x) - 2|$ , a następnie na podstawie tego wykresu podać liczbę rozwiązań równania z parametrem (zadanie 3 pr).

Duża grupa zdających dobrze poradziła sobie z podaniem opisu matematycznego (w postaci układu równań) typowej sytuacji praktycznej i rozwiązywaniem układu równań liniowych (zadanie 2 pp). Ale już w zadaniu z poziomu rozszerzonego analiza danych informacji i podanie opisu matematycznego (w postaci funkcji) było najtrudniejszą czynnością w całym arkuszu egzaminacyjnym. Zdający mieli problem z formułowaniem wniosków wynikających z postaci badanego wyrażenia i z posługiwaniem się własnościami funkcji kwadratowej w nietypowej sytuacji praktycznej (zadanie 4 pr).

Większość maturzystów poprawnie zastosowała wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego i umiała sprawdzić z definicji, czy dany ciąg jest geometryczny (zadanie 7 pp). Podobnie w zadaniu z poziomu rozszerzonego (zadanie 7 pr) zdający nie mieli trudności z wykorzystaniem własności ciągu geometrycznego do zapisania równania z jedną niewiadomą  $x$ . Jednak już oszacowanie ilorazu sumy 19-tu przez sumę 20-tu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego stanowiło barierę nie do pokonania dla większości zdających.

Zdający dobrze radzili sobie z zadaniami wykorzystującymi umiejętność wykonywania działań na potęgach o wykładnikach rzeczywistych (zadanie 4 pp). Mimo iż zadania typu „wykaż” z reguły budzą obawy zdających, to większość maturzystów z poziomu rozszerzonego nie miała problemów z przeprowadzeniem rozumowania opartego na własnościach potęg (zadanie 5 pr).

Tegorocznymi maturzycy poprawnie rozwiązywali zadania dotyczące typowych problemów geometrycznych o małym stopniu złożoności. Zdający wykazali się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, twierdzeń i definicji z zakresu stereometrii i geometrii analitycznej (zadania 9 pp i pr i 11 pp i pr). Nieco więcej problemów przysporzyło zdającym rozwiązanie zadania wymagającego zauważenia zależności wynikających z podobieństwa trójkątów (zadanie 8 pp). Problem, z którym mieli uporać się maturzycy w tym zadaniu był typowy, algorytmiczny, ale kolejny raz okazało się, że rozwiązywanie zadań z geometrii płaskiej jest dla maturzystów trudne, niezależnie od stopnia złożoności rozumowania, które powinni przeprowadzić. Podobnie w poziomie rozszerzonym zdający mieli problemy z rozwiązywaniem zadania wymagającego dostrzeżenia związków miarowych w figurach płaskich (zadanie 8 pr). W tym zadaniu maturzycy mieli trudności z przeprowadzeniem nieskomplikowanego dowodu, wykorzystującego związek pomiędzy długością przekątnej kwadratu a długością jego boku oraz związek między odległościami środków okręgów stycznych zewnętrznie.

Jak co roku słabą stroną zdających okazały się przekształcenia algebraiczne i obliczenia arytmetyczne. Niestety, popełniane w tym zakresie błędy często utrudniały rozwiązanie zadania. Innym problemem, zarówno tej jak i poprzednich matur, była forma udzielanych odpowiedzi, zwłaszcza przez zdających na poziomie podstawowym. Cieszyły rozwiązania przemyślane, pokazujące w sposób jasny i czytelny pełne zrozumienie problemu. Wielu zdających przedstawiało jednak rozwiązania niepełne, nie udzielało odpowiedzi zgodnej z poleceniem lub nie weryfikowało jej poprawności. Analizując prace maturzystów można zauważyć, że poziom merytoryczny odpowiedzi był zróżnicowany, a język matematyczny, jakim posługiwali się piszący, był niejednokrotnie nieporadny, a czasami prowadził do sprzeczności z wykonanymi wcześniej przekształceniami.

Również w tym roku, naturalne arkusze egzaminacyjne z matematyki zawierały wyłącznie zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, a więc takie, które wymagały od zdających wytworzenia całego rozwiązania, często zaplanowania ciągu powiązanych ze sobą logicznie czynności, następnie zrealizowania ich, a wreszcie poddania krytycznej ocenie uzyskanych rezultatów. Właśnie taka konstrukcja zadań z matematyki daje zdającym duże pole do popisu. Analizując rozwiązania zdających daje się zawsze wyłonić statystycznie najczęściej spotykane sposoby rozwiązań, niemniej jednak prawie zawsze daje się też dostrzec rozwiązania nieszablonowe, w których widać oryginalny pomysł na rozwiązanie zadania. Warto w tym miejscu pokazać autentyczne rozwiązania zdających, zarówno te typowe, najczęściej spotykane, jak i te wyjątkowe, spotykane znacznie rzadziej. Przytoczymy rozwiązania wybranych zadań z obydwu poziomów.

W zadaniu 2 z poziomu podstawowego większość poprawnych rozwiązań polegała na zapisaniu układu równań wynikających z treści zadania, przy czym o ile pierwszą informację podaną w treści zadania: „Dwaj rzemieślnicy przyjęli zlecenie wykonania wspólnie 980 detali. Zaplanowali, że każdego dnia pierwszy z nich wykona  $m$ , a drugi  $n$  detali. Obliczyli, że razem wykonają zlecenie w ciągu 7 dni”, zdający najczęściej bezbłędnie zapisywali w postaci równania:

$7(m+n)=980$  lub (po przeliczeniu na jeden dzień)  $m+n=140$ , to o tyle z zapisaniem w postaci równania drugiej informacji: „Po pierwszym dniu pracy pierwszy z rzemieślników rozchorował się i wtedy drugi, aby wykonać całe zlecenie, musiał pracować o 8 dni dłużej niż planował, (nie zmieniając liczby wykonywanych codziennie detali)”, zdający nie radzili sobie już tak łatwo. Najczęściej pojawiało się tu poprawne równanie  $m+15n=980$  lub znacznie rzadziej  $6m=8n$ . W tym miejscu pozostawała zdającym już tylko kwestia techniczna – rozwiązanie prostego układu równań liniowych. Poprawny wynik to  $m=80$  i  $n=60$ . Wśród rozwiązań tego zadania znaleźć można również rozwiązania sposobem arytmetycznym, niewymagające układania i rozwiązywania układu równań, a bazujące jedynie na wykonywaniu odpowiednich operacji arytmetycznych. Przykładem takiego rozwiązania jest:


$980:7=140$  – liczbę detali, jaką codziennie wykonaliby obaj robotnicy pracujący razem,  
 $980-140=840$  – taka liczba detali została do wykonania po pierwszym dniu pracy, a więc do wykonania przez drugiego robotnika, gdyż pierwszy pracował tylko w pierwszym dniu,  $840:14=60$  – tyle detali wykonywał dziennie drugi robotnik, gdyż sam pracował przez 14 dni, a musiał wykonać 840 detali,

$140-60=80$  – tyle detali wykonał dziennie pierwszy robotnik.

Odpowiedź:  $m=80$  i  $n=60$ .

To krótkie rozwiązanie sprowadza się do wykonania czterech działań na liczbach naturalnych. Samo ich wykonanie, w takiej właśnie kolejności pokazuje, że rozwiązujący zadanie bardzo dokładne zrozumiał treść zadania, potrafił rozwiązać problem używając do tego aparatu matematycznego na poziomie ucznia szkoły podstawowej. Spośród zdających, którzy w ten sposób rozwiązywali to zadanie znaczna większość nie zamieszczała wyjaśnień wykonywanych przez siebie operacji (w przeciwieństwie do zdającego, którego rozwiązanie zostało przytoczone powyżej) przyjmując słusznie, że są one oczywiste.

Ciekawych spostrzeżeń dostarcza obserwacja sposobów rozwiązania podpunktu a) zadania 6 z poziomu podstawowego. Można je podzielić na dwa typy. W pierwszym rozwiązujący stosowali definicje sinusa i tangensa kąta ostrego w trójkącie prostokątnym, po czym otrzymywali mniej lub bardziej skomplikowane nierówności między długościami boków trójkąta prostokątnego, w drugim wykorzystywali związki między funkcjami trygonometrycznymi, sprowadzając nierówność do oczywistej nierówności z funkcją (bądź funkcjami) trygonometryczną. Oto rozwiązanie z pierwszej grupy.



$$\sin \alpha - \operatorname{tg} \alpha < 0$$

$$\sin \alpha < \operatorname{tg} \alpha$$

$$\frac{a}{c} < \frac{a}{b} \quad / : a$$

$$\frac{1}{c} < \frac{1}{b} \quad / \cdot bc$$

$$b < c$$

Nierówność  $b < c$  jest prawdziwa, gdyż przyprostokątna jest zawsze krótsza od przeciwprostokątnej. W przedstawionym rozwiązaniu zwraca uwagę zwięzłość rozwiązania oraz konsekwentny wybór najkrótszej drogi zmierzającej do celu. Rozwiązujący przekształca w sposób równoważny nierówność, której prawdziwość należy uzasadnić, otrzymując w sposób oczywisty poprawną nierówność między długościami przyprostokątnej i przeciwprostokątnej. Sporządzenie rysunku trójkąta, jakkolwiek niekonieczne, upraszcza zapis rozwiązania.

Teraz rozwiązanie z grupy drugiej:

$$\sin \alpha - \operatorname{tg} \alpha < 0 \Leftrightarrow \sin \alpha - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} < 0 \Leftrightarrow \sin \alpha \cdot \left(1 - \frac{1}{\cos \alpha}\right) < 0 \Leftrightarrow 1 - \frac{1}{\cos \alpha} < 0, \text{ gdyż } \sin \alpha > 0$$

dla  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Następnie dostaję  $1 < \frac{1}{\cos \alpha} \Leftrightarrow \cos \alpha < 1$ , bo  $\cos \alpha > 0$  dla  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ .

Otrzymałem nierówność  $\cos \alpha < 1$ , która jest prawdziwa dla każdego kąta ostrego  $\alpha$ .

W tym rozwiązaniu zdający posługuje się symbolem równoważności, precyzyjnie uzasadniając równoważność kolejno otrzymywanych nierówności. W poprzednim rozwiązaniu można było mieć pewne wątpliwości, czy zdający na pewno ma świadomość, że wykonywane przez niego przejścia są równoważne. Tu takich wątpliwości nie mamy.

Oryginalne, choć niestety bardzo rzadkie, jest przedstawione poniżej rozwiązanie podpunktu c) zadania 7 z poziomu podstawowego. Zdający mieli, po uprzednim obliczeniu pierwszego wyrazu i różnicy ciągu arytmetycznego, wyznaczyć taką liczbę początkowych wyrazów ciągu, aby ich suma miała wartość najmniejszą. Standardowy (najczęściej występujący) sposób rozwiązania sprowadzał się do wyznaczenia najmniejszej wartości funkcji sumy  $S_n = n^2 - 12n$  określonej dla liczb całkowitych  $n \geq 1$ . Jednak w tym sposobie rozwiązania należy tę funkcję najpierw wyznaczyć, a następnie wyznaczyć szukaną wartość  $n$ . Poniżej przedstawiony sposób rozwiązania pokazuje, że nie jest to w ogóle konieczne.

$a_1 = -11 < 0$  i  $r = 2 > 0$  - ciąg rosnący, więc od pewnego momentu wyrazy będą dodatnie. Kolejne wyrazy tego ciągu to:  $a_2 = -9$ ,  $a_3 = -7$ ,  $a_4 = -5$ ,  $a_5 = -3$ ,  $a_6 = -1$ ,  $a_7 = 1$  (dalej są już tylko wyrazy dodatnie). Najmniejsza suma jest wtedy, gdy dodamy wszystkie wyrazy ujemne, czyli szukana liczba to  $n = 6$ .

W pozostałych zadaniach z poziomu podstawowego występowały rozwiązania standardowe, co nie znaczy, że nie warte uwagi. Wydaje się jednak, że wartościowsze jest zaprezentowanie rozwiązań niesztampowych, pokazujących różne sposoby myślenia prowadzące do osiągnięcia celu. Zdecydowanie więcej takich przykładów można znaleźć wśród rozwiązań zadań z poziomu rozszerzonego.

Najwięcej emocji wśród zdających poziom rozszerzony wzbudziło w tym roku zadanie 4. Można znaleźć zarówno prace bardzo dobre, w których zadanie to nie zostało rozwiązane bądź zostało rozwiązane błędnie, jak też i prace słabe, gdzie w zasadzie rozwiązane było tylko to zadanie. Z jednej strony okazało się najtrudniejszym zadaniem tegorocznego egzaminu maturalnego z matematyki, z drugiej było jednym z najrzadziej pomijanych zadań. Sposoby rozwiązania tego zadania można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należy zaliczyć te rozwiązania, w których zdający rozważali dwa ciągi: ciąg liczb monet, jakie skarbnik wkładał do skarbcza przez kolejne dni, stwierdzali, że jest to ciąg arytmetyczny o pierwszym wyrazie 25 i różnicy 2, oraz ciąg liczb monet, jakie król wyjmował przez kolejne dni ze skarbcza. Zdający zapisywali, że jest to ciąg stały. Ewentualnie rozpatrywali od razu ciąg różnic liczb monet wkładanych do skarbcza i wyjmowanych ze skarbcza. Na tej podstawie, wykorzystując wzór na sumę początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego, ustalali wzór określający liczbę monet w skarbcu w  $n$ -tym dniu. Do tego momentu zdający budowali model matematyczny opisujący treść zadania. Potem należało już tylko wyznaczyć dzień, w którym było najmniej monet w skarbcu i najmniejszą liczbę  $k$ , dla której w każdym momencie w skarbcu znajdowała się co najmniej jedna moneta. Można to wykonać czyniąc odpowiednie założenia dotyczące uzyskanej funkcji, bądź wykorzystując stosowne wzory lub odpowiednią postać wzoru funkcji kwadratowej. Druga grupa rozwiązań to rozwiązania „na piechotę”, w których zdający systematycznie obliczali liczby monet w skarbcu w kolejnych dniach, zauważając moment, w którym w skarbcu była tylko jedna moneta, a potem było ich już tylko więcej. Tego typu rozwiązań było najwięcej. W obu tych sposobach rozwiązań możemy wyróżnić dwa typy rozwiązania: pierwszy – ze względu na sposób wyznaczania najmniejszej wartości funkcji, drugiej – ze względu na sposób ustalenia dnia, w którym było w skarbcu najmniej monet. Można też znaleźć rozwiązania, które właściwie nie należą do żadnej z tych dwóch grup. Są to rozumowania analogiczne do zaprezentowanego wcześniej przykładu rozwiązania podpunktu c) zadania 7. z poziomu podstawowego.

Przytoczmy teraz kilka przykładów rozwiązań omówionych grup.

Rozwiązanie 1.  $a_1 = 25$  i  $r = 2$ , więc liczby monet wkładanych do skarbcza przez skarbnika przez kolejne dni tworzą ciąg arytmetyczny  $a_n = 25 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 23$ . Ze wzoru na sumę  $n$ -początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego obliczam  $S_n = \frac{25 + 2n + 23}{2} \cdot n$  - tyle monet skarbnik włożył do skarbcza przez  $n$  dni.  $n \cdot 50$  - tyle monet wzięł król. Razem w skarbcu było  $\frac{25 + 2n + 23}{2} \cdot n - 50n + k$  monet.

$$f(n) = \frac{25 + 2n + 23}{2} \cdot n - 50n + k = (n + 24)n - 50n + k = n^2 - 26n + k$$

Funkcja osiąga najmniejszą wartość dla  $n = \frac{26}{2} = 13$ , czyli w 13 dniu było najmniej monet.

$$f(13) = 13^2 - 26 \cdot 13 + k = 169 - 338 + k = k - 169$$

$$k - 169 \geq 1 \text{ czyli } k \geq 170$$

Odpowiedź. 13 dnia było w skarbcu najmniej monet,  $k = 170$ .

Nieznacznie różniące się, w ostatniej fazie rozwiązania, od zaprezentowanego, choć częściej spotykane, jest takie rozwiązanie (początkową część pomijamy, gdyż nie różni się w sposób istotny od poprzedniego):

Rozwiązanie 2. ....  $f(n) = n^2 - 26n + k$

Żeby zawsze była w skarbcu co najmniej jedna moneta, to musi być spełniony warunek

$$\Delta < 0$$

$$(-26)^2 - 4k < 0$$

$$4k > 676$$

$$k > 169 \Rightarrow k = 170$$

$$n_w = -\frac{-26}{2} = 13$$

Odpowiedź. Najmniejsza liczba  $k$  to 170. Wtedy najmniej monet będzie 13-tego dnia.

Jak widać tym razem zdający najpierw wyznaczył najmniejszą wartość  $k$ , a dopiero potem dzień, w którym w skarbcu było najmniej monet. Wykonał więc polecenia zadania dokładnie w takiej kolejności, jak w treści zadania. Należy tu jednak zauważyć, że gdyby zdający nie obliczył numeru dnia, w którym była najmniejsza liczba monet, a poprzestał jedynie na wyznaczeniu  $k = 170$ , to rozumowania zdającego nie można byłoby uznać za w pełni poprawne, gdyż warunek  $\Delta < 0$ , przy braku informacji o tym, czy pierwsza współrzędna wierzchołka paraboli o równaniu  $y = x^2 - 26x$  jest liczbą naturalną, nie jest poprawny.

W kolejnym rozwiązaniu z pierwszej grupy też zacytujemy jedynie ostatni fragment rozwiązania, istotnie różny od zaprezentowanych.

Rozwiązanie 3. ...  $f(n) = n^2 - 26n + k = n^2 - 26n + 169 + k - 169 = \underbrace{(n - 13)^2}_{\geq 0} + \underbrace{k - 169}_{\geq 1}$ .

Dla  $n = 13$  liczba monet będzie najmniejsza i żeby była choć jedna, to  $k - 169 \geq 1$ , czyli najmniejsza  $k$  wynosi 170.

W przytoczonym rozwiązaniu zdający wręcz wzorowo wykorzystał postać kanoniczną funkcji kwadratowej, z której wywnioskował od razu obie szukane liczby. Niestety rozwiązań tego typu jest bardzo niewiele, a szkoda, gdyż nie jest tu zdającemu potrzebny ani wzór na wyróżnik trójmianu kwadratowego, ani też na pierwszą współrzędną wierzchołka paraboli. Przez to rozwiązanie staje się bardzo krótkie i precyzyjne.

Kolejny przykład rozwiązania różni się od poprzednich fazą początkową tj. sposobem dochodzenia do wzoru funkcji liczby monet w skarbcu w  $n$ -tym dniu. Przedstawimy jedynie ten fragment rozwiązania.

Rozwiązanie 4.

$25 - 50 = -25$ ,  $27 - 50 = -23$ ,  $29 - 50 = -21$ , ... Jest to ciąg arytmetyczny, w którym  $a_1 = -25$  i  $r = 2$ .

$$S_n = \frac{2 \cdot (-25) + (n-1) \cdot 2}{2} \cdot n = (n-1-25) \cdot n = (n-26)n$$

$$f(n) = (n-26)n + k$$

...

Zdający od razu „powiązał” ze sobą oba ciągi liczb monet, tworząc w ten sposób ciąg „reszt”. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę, że wielu zdających, którzy rozwiązywali zadanie w ten

sposób, nie potrafiło sobie poradzić ze zmienną  $k$ , „wstawiając” ją błędnie do ciągu reszt, w efekcie rozpatrując ciąg o pierwszym wyrazie  $a_1 = k - 25$  i różnicy  $r = 2$ .

Kolejne rozwiązania należą do drugiej z grup.

Rozwiązanie 5.

dzień	skarbnik	król	skarbiec	
<u>1</u>	<u>25</u>	50	$k + 25 - 50 = k - 25$	$k_{\min} = 26$
<u>2</u>	<u>27</u>	50	$k - 25 + 27 - 50 = k - 48$	$k_{\min} = 49$
3	29	50	$k - 48 + 29 - 50 = k - 69$	$k_{\min} = 70$
4	31	50	$k - 69 + 31 - 50 = k - 88$	$k_{\min} = 89$
5	33	50	$k - 88 + 33 - 50 = k - 105$	$k_{\min} = 106$
6	35	50	$k - 105 + 35 - 50 = k - 120$	$k_{\min} = 121$
7	37	50	$k - 120 + 37 - 50 = k - 133$	$k_{\min} = 134$
8	39	50	$k - 133 + 39 - 50 = k - 144$	$k_{\min} = 145$
9	41	50	$k - 144 + 41 - 50 = k - 153$	$k_{\min} = 154$
10	43	50	$k - 153 + 43 - 50 = k - 160$	$k_{\min} = 161$
11	45	50	$k - 161 + 45 - 50 = k - 165$	$k_{\min} = 166$
12	47	50	$k - 165 + 47 - 50 = k - 168$	$k_{\min} = 169$
13	49	50	$k - 168 + 49 - 50 = k - 169$	$k_{\min} = 170$
14	51	50	$k - 169 + 51 - 50 = k - 168$	$k_{\min} = 169$

Dalej już będzie dobrze, bo więcej będzie monet dokładanych niż zabieranych. Najmniej  $k$  musi wynosić 170. W 13 dniu będzie najmniej monet.

Zdający analizował „sytuację” w skarbcu przez kolejnych 14 dni, a w zasadzie dłużej (o czym świadczy zapis pod tabelą), zauważył, że neuralgiczny dzień to 13. Dla każdego dnia z osobna wyznaczył najmniejszą liczbę  $k$ . Określił, choć tego nie zapisał, rekurencyjny wzór na liczbę monet w skarbcu w  $n$ -tym dniu. Można oczywiście takiemu rozwiązaniu zarzucać, że nie jest egzemplifikacją metody. Jest to jednak chyba zbyt poważny zarzut. Wszak to problem postawiony w zadaniu powinien być źródłem doboru sposobu jego rozwiązania, a nie odwrotnie. W tym zadaniu zdający skutecznie poradził sobie z problemem.

Oto ostatnie z rozwiązań tego zadania, jakie zaprezentujemy.

Rozwiązanie 6.

Na początku skarbnik wkłada mniej monet, niż król wyjmuje, ale skarbnik dorzuca każdego dnia o 2 monety więcej, niż poprzedniego, więc wystarczy znaleźć pierwszy dzień, kiedy skarbnik włoży tyle monet, ile wyjmie król albo więcej.

$$a_1 = 25, r = 2, \text{ więc } a_n = 25 + (n-1) \cdot 2 = 2n + 23$$

$$2n + 23 \geq 50$$

$$2n \geq 27$$

$$n \geq 13,5$$

Z tego wynika, że najgorsza sytuacja w skarbcu była 13 tego dnia, a od 14 tego dalej było już tylko lepiej.

$$25 + 27 + \dots (2 \cdot 13 + 23) - 13 \cdot 50 = \frac{25 + 49}{2} \cdot 13 - 650 = 481 - 650 = -169$$

Żeby nie zabrakło monet (nawet w 13 dniu), to  $k = 170$ .

Ten sposób rozwiązania jest bardzo oryginalny. Pokazuje, że zdający dokładnie rozumie całą sytuację opisaną w zadaniu jako proces dynamiczny, potrafi bezbłędnie wyznaczyć dzień „najgorszy” (jak sam go nazywa). Potem rozwiązanie sprowadza się już tylko do obliczenia sumy 13 kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego. Zdający wykorzystał tu wzór na sumę  $n$ -początkowych wyrazów takiego ciągu, jednak równie dobrze mógłby po prostu zsumować te liczby posługując się kalkulatorem. Tak jak już to wcześniej zasygnalizowaliśmy rozwiązania takie były bardzo rzadkie, a szkoda, gdyż w ten sposób można rozwiązać najtrudniejsze zadanie egzaminu maturalnego z matematyki w tym roku, wykorzystując jedynie wzór na  $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego i rozwiązując prostą nierówność liniową.

W każdym z poprawnych rozwiązań zadania 5 z poziomu rozszerzonego zdający musieli zastosować własności potęg o wykładnikach rzeczywistych. Po raz pierwszy na egzaminie maturalnym z matematyki zdarzyło się, że zadanie z poleceniem „wykaż” jest zadaniem łatwym. Wydaje się, że nauczyciele umiejętnie „oswajają” uczniów z zadaniami na dowodzenie, a zdający nie opuszczają pochopnie takich zadań tylko z tego powodu, że zawierają one słowo „wykaż”, czy „udowodnij”. Poniżej przytoczymy kilka typowych poprawnych rozwiązań.

Rozwiązanie 1.

$$\text{Założenie: } A = 3^{4\sqrt{2}+2} \text{ i } B = 3^{2\sqrt{2}+3}$$

$$\text{Teza: } B = 9\sqrt{A}$$

$$\text{Dowód: } 9\sqrt{A} = 9 \cdot \sqrt{3^{4\sqrt{2}+2}} = 3^2 \cdot \sqrt{(3^{2\sqrt{2}+1})^2} = 3^2 \cdot 3^{2\sqrt{2}+1} = 3^{2\sqrt{2}+3} = B$$

Zdający wyraźnie zapisał założenie, tezę i przeprowadził dowód wychodząc od lewej strony udowodnianej równości i dochodząc do jej strony prawej. Zwykle zdający ograniczali się jedynie do dowodu.

$$\text{Rozwiązanie 2. } B = 3^{2\sqrt{2}+3} = 3^{2\sqrt{2}+1+2} = 3^{2\sqrt{2}+1} \cdot 3^2 = 3^{(4\sqrt{2}+2)\frac{1}{2}} \cdot 3^2 = \sqrt{3^{4\sqrt{2}+2}} \cdot 9 = 9\sqrt{A}$$

Zdający przeprowadził dowód, przechodząc od lewej do prawej strony równości, wykonując w gruncie rzeczy te same operacje co w rozwiązaniu 1.

Rozwiązanie 3.

$$B = 9\sqrt{A} \quad /^2$$

$$B^2 = 81A$$

$$(3^{2\sqrt{2}+3})^2 = 81 \cdot 3^{4\sqrt{2}+2}$$

$$3^{4\sqrt{2}+6} = 3^4 \cdot 3^{4\sqrt{2}+2}$$

$$3^{4\sqrt{2}+6} = 3^{4\sqrt{2}+6}$$

W tym rozwiązaniu zdający przekształcał równoważnie dowodzoną nierówność, dochodząc w rezultacie do tożsamości. Inne z rozwiązań w mniejszym lub większym stopniu sprowadzały się do zaprezentowanych. Zadanie to skutecznie różnicowało osoby, które miały elementarne braki w umiejętnościach wykonywania działań na potęgach od tych, którzy te proste umiejętności opanowali.

Rozwiązać zadanie 6 z poziomu rozszerzonego mogli jedynie ci zdający, którzy potrafili poprawnie zapisać warunki wynikające z definicji logarytmu. Dla tegorocznych maturzystów i tych z lat ubiegłych logarytmy w całości znajdują się na poziomie rozszerzonym, ale już od roku przyszłego pojęcie logarytmu (jako liczby) i własności logarytmów (poza wzorem na zamianę podstawy logarytmu) znajdują się w podstawie programowej na poziomie podstawowym. Poprawne rozwiązania zdających różniły się w zasadzie tylko w sposobie ustalania tych argumentów funkcji  $f$ , dla których spełnione są warunki  $2\cos x \neq 1$  i  $2\cos x > 0$ . Jedna grupa zdających rozwiązywała te nierówności w sposób ogólny (w całym zbiorze liczb rzeczywistych), a następnie wyznaczała część

wspólną zbiorów rozwiązań tych nierówności i nierówności kwadratowej  $9 - x^2 > 0$ . Druga grupa od razu uwzględniła przedział  $(-3, 3)$  tj. zbiór rozwiązań nierówności kwadratowej, ograniczając w ten sposób odczytywanie argumentów funkcji  $f$ , dla których spełnione są warunki  $2\cos x \neq 1$  i  $2\cos x > 0$  do przedziału  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ .

Przykładem takiego rozwiązania jest:

Rozwiązanie 1. Z definicji logarytmu wynika:


$$9 - x^2 > 0 \text{ i } 2\cos x \neq 1 \text{ i } 2\cos x > 0$$

$$(3 - x)(3 + x) > 0 \text{ i } \cos x \neq \frac{1}{2} \text{ i } \cos x > 0$$

$$x \in (-3, 3) \text{ i } x \neq -\frac{\pi}{3} \text{ i } x \neq \frac{\pi}{3} \text{ i } x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$$

Dziedzina funkcji jest więc zbiór

$$D_f = \left(-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right) \cup \left(-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right).$$



Rozwiązania zadania 7 – poziom rozszerzony – do momentu obliczenia ilorazu ciągu przybiegały właściwie tak samo, przy czym zdający albo wykorzystywali własność ciągu geometrycznego i od razu zapisywali równanie z niewiadomą  $x$ , albo też wykorzystywali definicję bądź wzór ogólny ciągu, wprowadzali oznaczenie  $q$  ilorazu ciągu i zapisywali układ równań, który też sprowadzali do równania z jedną niewiadomą. Część druga zadania polegająca na uzasadnieniu nierówności  $\frac{S_{19}}{S_{20}} < \frac{1}{4}$

wykonywana była znacznie rzadziej, niemniej jednak wystąpiły różne, zasługujące na pokazanie, sposoby uzasadnienia. Zacytujemy jedynie te fragmenty rozwiązań, które dotyczą części drugiej rozwiązania.

Rozwiązanie 1.

$$\frac{S_{19}}{S_{20}} < \frac{1}{4}, \quad \frac{a_1 \cdot \frac{1-4^{19}}{1-4}}{a_1 \cdot \frac{1-4^{20}}{1-4}} < \frac{1}{4}, \quad \frac{4^{19}-1}{4^{20}-1} < \frac{1}{4}, \quad 4(4^{19}-1) < 4^{20}-1, \quad 4^{20}-4 < 4^{20}-1, \quad -4 < -1, \text{ co jest prawdą.}$$

W tym sposobie zdający przekształcał dowodzoną nierówność dochodząc do nierówności prawdziwej w sposób oczywisty.

Rozwiązanie 2.

$$\frac{S_{19}}{S_{20}} = \frac{2 \cdot \frac{1-4^{19}}{1-4}}{2 \cdot \frac{1-4^{20}}{1-4}} = \frac{1-4^{19}}{1-4^{20}} = \frac{4^{19}-1}{4^{20}-1} < \frac{4^{19}-1}{4^{20}-4} = \frac{4^{19}-1}{4(4^{19}-1)} = \frac{1}{4}.$$


Tu zdający w ładny sposób oszacował dodatni ułamek  $\frac{4^{19}-1}{4^{20}-1}$  przez większy od niego ułamek

$\frac{4^{19}-1}{4^{20}-4}$  (zmniejszając mianownik o 3). Sposób ten szczególnie zasługuje na podkreślenie, gdyż umiejętność szacowania wartości wyrażeń liczbowych nie jest powszechna wśród polskich maturzystów, a warto dodać, że jest to umiejętność często wykorzystywana w innych dziedzinach wiedzy takich jak fizyka, chemia, biologia czy geografia.

Kolejnym zadaniem z poziomu rozszerzonego, którego przykłady rozwiązań warto przytoczyć jest zadanie 8. Jest to zadanie na dowodzenie, a jednocześnie z geometrii syntetycznej. Zdający miał o tyle ułatwione zadanie, że nie musiał mozolnie interpretować treści zadania, miał sporządzony rysunek obrazujący całą sytuację. Cały dowód sprowadzał się do zapisania w formie odpowiedniej równości zależności między promieniami obu rozpatrywanych okręgów. Po poprawnym zapisaniu tej zależności następowały już czynności czysto techniczne – rachunki prowadzące do obliczenia stosunku tych promieni. Przedstawimy dwa rozwiązania ilustrujące nieco różniące się drogi dojścia do zależności.



Rozwiązanie 1.



Trójkąt  $ABC$  jest prostokątny i równoramienny. Ze wzoru na przekątną kwadratu otrzymujemy

$$R + r = (R - r)\sqrt{2}$$

$$R + r = R\sqrt{2} - r\sqrt{2}$$

$$r\sqrt{2} + r = R\sqrt{2} - R$$


$$R(\sqrt{2} - 1) = r(\sqrt{2} + 1) \quad / : r \cdot (\sqrt{2} + 1)$$

$$\frac{R}{r}(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1) = (\sqrt{2} + 1)^2$$

$$\frac{R}{r} = 3 + 2\sqrt{2}$$

W przytoczonym rozwiązaniu zdający od razu zapisał zależność między promieniami okręgów, zauważając, że trójkąt  $ABC$  jest „połówką” kwadratu. Podstawą sukcesu tego rozwiązania jest umiejętne „uzupełnienie” rysunku zamieszczonego w treści zadania o odcinek łączący wierzchołek kąta prostego z środkiem  $B$ , odcinek prostopadły do ramienia kąta łączący punkt  $B$  z tym ramieniem i wreszcie odcinek  $AC$  równoległy do tego ramienia.

Rozwiązanie 2.



$$\begin{cases} \sin 45^\circ = \frac{R}{R + r + x} \\ \sin 45^\circ = \frac{r}{x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{R}{R + r + x} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{r}{x} \Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{2}}r \end{cases}$$

$$\sqrt{2} \left( R + r + \frac{2}{\sqrt{2}}r \right) = 2R$$

$$\sqrt{2}R + \sqrt{2}r + 2r = 2R$$

$$(\sqrt{2} + 2)r = (2 - \sqrt{2})R$$

$$\frac{R}{r} = \frac{\sqrt{2} + 2}{2 - \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2} + 2)(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{2\sqrt{2} + 2 + 4 + 2\sqrt{2}}{4 - 2} = \frac{4\sqrt{2} + 6}{2} = 2\sqrt{2} + 3$$

$$\frac{R}{r} = \frac{\sqrt{2} + 2}{2 - \sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{2} + 2)(2 + \sqrt{2})}{(2 - \sqrt{2})(2 + \sqrt{2})} = \frac{2\sqrt{2} + 2 + 4 + 2\sqrt{2}}{4 - 2} = \frac{4\sqrt{2} + 6}{2} = 2\sqrt{2} + 3$$

Tu zdający zastosował funkcję sinus i zbudował układ równań, który umiejętnie przekształcając doprowadził go do uzyskania tezy zadania. Sposób ten jest dłuższy od poprzedniego, choć równie skuteczny.

Wyniki egzaminu maturalnego i uwagi egzaminatorów, którzy sprawdzali prace egzaminacyjne, kolejny raz pokazały, że zdający w wielu zadaniach wykazali się umiejętnością budowania modelu matematycznego dla opisanej sytuacji oraz umiejętnością poprawnego wyboru algorytmu rozwiązania. Zdający poprawnie rozwiązywali problemy typowe, o małym stopniu złożoności. W przypadku zadań nietypowych, wymagających rozwiązywania problemów matematycznych, większość zdających miała trudności już na etapie analizy zadania. Egzamin pokazał, że w pracy dydaktycznej z uczniami należy zwrócić uwagę na kształcenie umiejętności analizy warunków zadania i doboru optymalnych metod rozwiązywania problemów matematycznych. Należy pracować nad tym, aby uczniowie dobrze rozumieli wprowadzane na zajęciach definicje i twierdzenia oraz potrafili je interpretować (także geometrycznie). Ułatwia to budowanie modelu matematycznego, zwłaszcza w przypadku zadań praktycznych i zadań z rachunku prawdopodobieństwa. Poziom merytoryczny odpowiedzi uczniów był bardzo zróżnicowany. Obok rozwiązań, świadczących o wiedzy i umiejętności samodzielnej myślenia zdarzały się odpowiedzi

błędne i nielogiczne. W wielu pracach raził język matematyczny, jakim posługiwali się zdający. Zwłaszcza na poziomie podstawowym był on często nieporadny, nieprecyzyjny, a stosowanie niewłaściwych symboli matematycznych prowadziło do sprzeczności w rozwiązaniu zadania. Wielu zdających nie udzielało odpowiedzi zgodnej z warunkami zadania, co wskazuje na to, że nieuważnie czytali treść zadania i bezkrytycznie podchodzili do uzyskiwanych wyników. Kolejny raz okazało się, że poważnym mankamentem była niedostateczna sprawność w przekształcaniu wyrażeń. Często zdający poprawnie analizowali warunki zadania, poprawnie zapisywali równania, ale błędy w przekształceniach algebraicznych i błędy rachunkowe uniemożliwiały im rozwiązanie zadania lub prowadziły do niepoprawnych odpowiedzi.

Analiza poszczególnych zadań wskazuje, że w pracy dydaktycznej z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego warto zwrócić uwagę na kształcenie takich podstawowych umiejętności jak:

- poprawna analiza zadania,
- czytelne zapisywanie toku myślenia,
- logiczne wnioskowanie,
- rozumienie pojęć (a nie opieranie się w rozwiązaniu na znanych algorytmach),
- tworzenie prostych modeli matematycznych do zadań praktycznych,
- sprawne posługiwanie się *Zestawem wybranych wzorów matematycznych*.

Ważne jest, aby maturzyści uważnie czytali i analizowali treść zadań, a następnie udzielali zwięzłej i precyzyjnej odpowiedzi, zgodnej z przedstawionym poleceniem. Uczniowie przygotowujący się do egzaminu maturalnego z matematyki powinni korzystać między innymi z materiału ćwiczeniowego, jakim są arkusze egzaminacyjne umieszczone na stronach internetowych CKE i OKE, a przede wszystkim z *Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki od 2010 roku*.

*Matematyka jest miarą wszystkiego* – w związku z obowiązkowym od roku 2010 egzaminem maturalnym z matematyki, także miarą dojrzałości do podjęcia nauki na wyższej uczelni. Dlatego warto uświadomić maturzystom, że znajomość matematyki na poziomie podstawowym to fundament logicznego myślenia w każdym aspekcie życia. Konieczne jest położenie nacisku w kształceniu matematycznym nie tylko na sprawne operowanie algorytmami, ale i na rozwijanie umiejętności modelowania matematycznego, doboru strategii rozwiązania zadania i umiejętność argumentowania i rozumowania. Ważne jest, aby nie tylko rzetelnie „przerobić” materiał nauczania, przećwiczyć określone zadania, ale i pokazać uczniom różne strategie uczenia się, studiowania matematyki. Należy wspierać w nich naturalną ciekawość i próby poszukiwania nietypowych rozwiązań, budować wiarę we własne możliwości i umiejętności.

## MATEMATYKA

### 1. Opis arkuszy

#### 1.1. Poziom podstawowy

Arkusz egzaminacyjny z matematyki dla poziomu podstawowego (czas trwania egzaminu 120 minut) zawierał 11 zadań otwartych. Zadania te badały przede wszystkim znajomość i rozumienie podstawowych pojęć matematycznych, definicji i twierdzeń oraz umiejętność posługiwania się tą wiedzą w praktyce. Sprawdzały umiejętność analizowania i interpretowania problemów matematycznych oraz formułowania opisu matematycznego danej sytuacji.

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu dla poziomu podstawowego obejmowała większość treści z podstawy programowej. Najliczniej były reprezentowane zadania dotyczące funkcji i ich własności, ciągów, wielomianów, planimetrii i stereometrii z zastosowaniem trygonometrii. W arkuszu umieszczono również zadania z tzw. kontekstem praktycznym. Za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać 50 pkt.

#### 1.2. Poziom rozszerzony


Arkusz dla poziomu rozszerzonego (czas trwania egzaminu 180 minut) również zawierał 11 zadań otwartych. Sprawdzały one wiadomości i umiejętności określone w standardach wymagań egzaminacyjnych dla poziomu rozszerzonego. Zadania egzaminacyjne badały przede wszystkim umiejętność poprawnego interpretowania tekstu matematycznego, analizowania sytuacji problemowych i podawania do nich opisu matematycznego oraz argumentowania i prowadzenia matematycznego rozumowania.

Tematyka zadań egzaminacyjnych w arkuszu dla poziomu rozszerzonego obejmowała: własności funkcji (liniowej, logarytmicznej, wykładniczej, z wartością bezwzględną), wielomiany, ciągi liczbowe, planimetrię i stereometrię, zagadnienia geometrii analitycznej, rachunek prawdopodobieństwa. Za rozwiązanie zadań zdający mógł otrzymać 50 pkt.

Zdecydowana większość, bo 83% spośród 76900 zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego z matematyki zdawała go jako przedmiot obowiązkowy.

## 2. Wyniki maturzystów

### 2.1. Poziom podstawowy




Wykres 1. Rozkład wyników egzaminu na poziomie podstawowym

Tabela 1. Wyniki maturzystów – parametry statystyczne


Liczba zdających	Minimum	Maksimum	Mediana	Średnia	Odchylenie standardowe	Odsetek sukcesów
42169	0	100	50	49	22,24	81

Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach.

Średni wynik egzaminu na poziomie podstawowym wynosi 49% i jest o 4,2 punkty procentowe niższy niż w 2008 r. Wykres przedstawiający rozkład wyników na poziomie podstawowym jest symetryczny. Wysoki jest udział zdających, którzy osiągnęli wynik zbliżony do średniej. Niewielki jest odsetek osób, które osiągnęły niski lub wysoki wynik. W bieżącym roku odsetek zdających, którzy zaliczyli ten egzamin jest o 4,7 punkty procentowe niższy niż w roku ubiegłym.



Wykres 2. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół



Wykres 3. Średnie wyniki w różnych typach szkół

Arkusz dla poziomu podstawowego okazał się trudny dla ogółu zdających. Dla absolwentów liceów ogólnokształcących arkusz był umiarkowanie trudny (średnia uzyskanych wyników 54%), dla absolwentów liceów profilowanych i techników – trudny, a dla absolwentów liceów uzupełniających i techników uzupełniających – bardzo trudny.

Różnice między osiągnięciami absolwentów różnych typów szkół są znaczne. Średni wynik maturzysty z technikum uzupełniającego jest o 27 punktów procentowych niższy niż średni wynik absolwenta technikum i aż o 39 punktów procentowych niższy od wyniku absolwenta liceum ogólnokształcącego.

### 2.1.1. Poziom wykonania zadań

Tabela 2. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca zadań

Nr zadania	Obszar standardów	Sprawdzana umiejętność Zdający	Poziom wykonania zadania	Moc różnicująca
1	Korzystanie z informacji	wyznacza wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowe	0,61	0,70
		rysuje wykres funkcji		
		odczytuje własności funkcji liniowej		
	Wiadomości i rozumienie	wyznacza liczby całkowite należące do danego przedziału liczbowego		
2	Tworzenie informacji	podaje opis matematyczny sytuacji przedstawionej w zadaniu w postaci układu równań	0,62	0,47
	Korzystanie z informacji	rozwiązuje układ równań liniowych		
3	Korzystanie z informacji	rozwiązuje nierówność kwadratową zapisaną na podstawie tekstu zadania	0,53	0,71
		podaje zbiór wartości funkcji		
		przekształca wzór funkcji do innej postaci		
4	Korzystanie z informacji	stosuje prawa działań na potęgach o wykładniku naturalnym	0,42	0,61
	Wiadomości i rozumienie	rozwiązuje równania liniowe		
5	Tworzenie informacji	zapisuje warunki wynikające z równości wielomianów	0,46	0,71
	Korzystanie z informacji	rozwiązuje układ równań liniowych		
		rozkłada wielomian na czynniki		
6	Korzystanie z informacji	stosuje definicje funkcji trygonometrycznych do rozwiązania problemu	0,29	0,62
	Tworzenie informacji	uzasadnia nierówności		
	Korzystanie z informacji	stosuje związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta do przekształcania tożsamości trygonometrycznych		
7	Korzystanie z informacji	stosuje wzór na $n$ -ty wyraz ciągu arytmetycznego	0,58	0,68
	Wiadomości i rozumienie	sprawdza, z definicji, czy dany ciąg jest geometryczny		
		stosuje definicję na sumę $n$ początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego		
	Korzystanie z informacji	wykorzystuje własności funkcji kwadratowej		
8	Tworzenie informacji	dobiera odpowiedni algorytm do rozwiązania zadania	0,32	0,48
	Wiadomości i rozumienie	stosuje związki miarowe w figurach płaskich		

9	Korzystanie z informacji	wyznacza równania prostych spełniające warunki zadania	0,52	0,64
		oblicza współrzędne punktu przecięcia dwóch prostych		
	Wiadomości i rozumienie	wykorzystuje pojęcie odległości na płaszczyźnie kartezjańskiej		
10	Korzystanie z informacji	oblicza średnią arytmetyczną	0,45	0,58
		oblicza prawdopodobieństwo zdarzeń		
11	Korzystanie z informacji	stosuje związki miarowe w bryłach z użyciem trygonometrii	0,56	0,60
	Wiadomości i rozumienie	szacuje wartości liczbowe		

W arkuszu dla poziomu podstawowego zadania okazały się umiarkowanie trudne i trudne. Osiem zadań to zadania umiarkowanie trudne (zadania 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11), dawały one możliwość zdobycia 76% punktów, zaś trzy zadania były trudne (zadania 4, 6, 8). Najwyższy poziom wykonania miało zadanie 2 (0,62). Zadanie to sprawdzało umiejętność tworzenia opisu matematycznego sytuacji przedstawionej w zadaniu w postaci układu równań oraz rozwiązywania układu równań liniowych.


Najtrudniejsze okazały się zadania: sprawdzające umiejętność stosowania praw działań na potęgach o wykładniku naturalnym (zadanie 4), stosowania definicji funkcji trygonometrycznych do rozwiązania problemu (zadanie 6), stosowania związków miarowych w figurach płaskich (zadanie 8).

Tabela 3. Rozkład wyników uczniów na skali staninowej


Klasa (stanin)	Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe)	Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach (procenty podano w przybliżeniu)
1	0–10	4
2	11–18	7
3	19–30	12
4	31–42	17
5	43–54	20
6	55–66	17
7	67–76	12
8	77–86	7
9	87–100	4

Zdający, których wyniki znalazły się w poszczególnych staninach, otrzymywali podczas tegorocznego egzaminu mniej punktów niż w roku ubiegłym, np. zdający, których wyniki mieszczą się w średnim staninie, otrzymywali 43–54% punktów (w ubiegłym roku było to 47–60 procent).

## 2.2. Poziom rozszerzony



Wykres 4. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym



Wykres 5. Rozkład wyników egzaminu na poziomie rozszerzonym zdawanym jako przedmiot obowiązkowy



Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło 34731 zdających, z czego 63% zdawało ten egzamin jako przedmiot obowiązkowy.


Zdający ci, uzyskali wyższe wyniki. przez tych zdających, wynosi 66,36%, a mediana 68%. Progu zdawalności nie przekroczyło tylko 3% maturzystów.

Tabela 4. Wyniki maturzystów – parametry statystyczne

Liczba zdających	Minimum	Maksimum	Mediana	Średnia	Odchylenie standardowe	Odsetek sukcesów
21384	0	100	60	58,44	23,38	97


Parametry statystyczne wyliczono do wyników wyrażonych w procentach. Dane w ostatniej kolumnie tabeli dotyczą tylko tych absolwentów, którzy zadeklarowali matematykę jako przedmiot obowiązkowy.

Średni wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym wynosi 58,44% i jest wyższy niż w roku ubiegłym. Wysoki jest udział maturzystów, którzy osiągnęli wynik zbliżony i wyższy od średniej.



Wykres 6. Procent zdanych egzaminów w różnych typach szkół

Chociaż absolwenci techników uzupełniających zdali w 100%, to egzamin był dla nich bardzo trudny, na co wskazuje średnia wyników. Podczas gdy w technikach uzupełniających wyniosła ona 10%, w liceach ogólnokształcących była o 50 punktów procentowych wyższa.



Wykres 7. Średnie wyniki w różnych typach szkół

Najwyższym poziomem osiągnąć wykazali się absolwenci liceów ogólnokształcących, dla których egzamin okazał się umiarkowanie trudny. Dla zdających z pozostałych typów szkół egzamin był trudny (licea profilowane i technika) i bardzo trudny (licea uzupełniające i technika uzupełniające).

Tabela 5. Poziom wykonania zadań i moc różnicująca zadań

Nr zadania	Obszar standardów	Sprawdzana umiejętność Zdający	Poziom wykonania zadania	Moc różnicująca
1	Wiadomości i rozumienie	wykorzystuje pojęcie wartości argumentu i wartości funkcji	0,79	0,64
	Tworzenie informacji	interpretuje otrzymane wyniki rysuje w układzie współrzędnych zbiór opisany układem warunków		
2	Korzystanie z informacji	zapisuje wielomianu, który przy dzieleniu przez dany dwumian daje wskazany iloraz i daną resztę	0,71	0,60
	Wiadomości i rozumienie	wykonuje działania na wielomianach		
	Korzystanie z informacji	wyznacza pierwiastki wielomianu		
3	Wiadomości i rozumienie	wykorzystuje definicję funkcji wykładniczej	0,78	0,65
	Korzystanie z informacji	rysuje wykres funkcji typu $y =  f(x) - b $		
	Tworzenie informacji	interpretuje liczbę rozwiązań równania z parametrem		

4	Korzystanie z informacji	wykorzystuje definicję ciągu arytmetycznego	0,33	0,45
	Tworzenie informacji	podaje opis matematyczny sytuacji w postaci funkcji		
	Korzystanie z informacji	formułuje wnioski wynikające z postaci badanego wyrażenia posługuje się definicją i własnościami funkcji kwadratowej		
5	Korzystanie z informacji	wykonuje działania na potęgach o wykładnikach rzeczywistych	0,80	0,57
6	Korzystanie z informacji	posługuje się definicją logarytmu	0,57	0,76
	Wiadomości i rozumienie	rozwiązuje nierówności kwadratowe		
	Korzystanie z informacji	odczytuje z wykresu odpowiedniej funkcji zbiór rozwiązań nierówności trygonometrycznej w przedziale ograniczonym zapisuje część wspólną zbiorów w postaci sumy przedziałów liczbowych		
7	Korzystanie z informacji	Stosuje własności ciągu geometrycznego	0,49	0,61
	Wiadomości i rozumienie	rozwiązuje równania kwadratowe		
	Tworzenie informacji	dokonuje wyboru ciągu spełniającego warunki zadania		
	Korzystanie z informacji	stosuje definicję ciągu geometrycznego		
	Tworzenie informacji	oszacowuje iloraz sumy 19-tu przez sumę 20-tu początkowych wyrazów ciągu geometrycznego		
8	Tworzenie informacji	podaje opis matematyczny danej sytuacji problemowej	0,50	0,69
		przetwarza informacje do postaci ułatwiającej rozwiązanie problemu		
9	Wiadomości i rozumienie	wyznacza środek i promień okręgu	0,58	0,73
	Korzystanie z informacji	wyznacza równanie rodziny prostych (nierównoległych do osi $Oy$ ) przechodzących przez dany punkt		
	Tworzenie informacji	analizuje wzajemne położenie prostej i okręgu stosuje wzór na odległość punktu od prostej wyciąga wnioski i zapisuje równania prostej		
10	Tworzenie informacji	analizuje sytuację i buduje jej model matematyczny	0,48	0,68
	Korzystanie z informacji	oblicza prawdopodobieństwo		
11	Korzystanie z informacji	wykorzystuje funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym	0,58	0,71
	Tworzenie informacji	rysuje przekrój ostrosłupa płaszczyzną		
	Korzystanie z informacji	stosuje twierdzenie kosinusów oblicza pole przekroju ostrosłupa		

Poziom wykonania wszystkich zadań mieści się w przedziale 0,33–0,80. Dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania sprawdzające umiejętność dobrania odpowiedniego algorytmu

do wskazanej sytuacji problemowej i podanie jej opisu matematycznego (zadanie 4), formułowania i uzasadniania wniosków oraz zapisywania ich w sposób czytelny i poprawny językowo (zadanie 7), analizowania sytuacji i budowanie jej modelu matematycznego (zadanie 10).

Łatwymi okazały się zadania sprawdzające umiejętność stosowania funkcji liniowej i wykorzystywania jej własności (zadanie 1), zastosowania twierdzenia o podzielności wielomianu przez dwumian do znalezienia pierwiastków wielomianu (zadanie 2), wykorzystania własności funkcji wykładniczej oraz sporządzania wykresu funkcji z wartością bezwzględną, odczytywania liczby rozwiązań równania w zależności od parametru (zadanie 3), wykonywania działań na potęgach o wykładnikach rzeczywistych (zadanie 5).

Tabela 6. Rozkład wyników uczniów na skali staninowej

Nazwa klasy	Wyniki na świadectwie (przedziały procentowe)	Procent zdających w kraju, którzy uzyskali wyniki w poszczególnych przedziałach (procenty podano w przybliżeniu)
najniższa	0–10	4
bardzo niska	11–28	7
niska	29–40	12
poniżej średniej	41–54	17
średnia	55–66	20
powyżej średniej	67–76	17
wysoka	78–86	12
bardzo wysoka	87–94	7
najwyższa	95–100	4

Zdający, których wyniki znalazły się w poszczególnych staninach, otrzymywali podczas tegorocznego egzaminu większą liczbę punktów niż w roku ubiegłym, np. zdający, których wyniki mieszczą się w średnim stanie, otrzymywali 55-66% punktów (w ubiegłym roku było to 47-64 procent).

### 3. Podsumowanie

Większość zdających egzamin maturalny z matematyki wykazała się dobrym opanowaniem umiejętności z obszaru I i II standardów, np. umiejętnością stosowania własności funkcji, stosowania rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki w zadaniach, wyznaczania pierwiastków wielomianu, stosowania przedstawionego algorytmu do prowadzenia rozumowania typu matematycznego, zastosowania związków miarowych w zadaniach praktycznych. Ważne jest to, że zadania sprawdzające najbardziej podstawowe wiadomości i umiejętności osiągnęły na egzaminie satysfakcjonujące wskaźniki łatwości.

Najtrudniejszymi okazały się zadania sprawdzające umiejętności z obszaru standardu III, w których zdający mieli wykazać się umiejętnością budowania modelu matematycznego do przedstawionych problemów, prowadzenia rozumowań typu matematycznego, wyciągania wniosków. Zadania z tego obszaru najbardziej różnicowały zdających.

Analiza poszczególnych części egzaminu oraz zadań wskazuje, że w pracy dydaktycznej z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego w kolejnych sesjach warto zwrócić uwagę na kształcenie podstawowych umiejętności:

- poprawnej analizy zadania,
- czytelnego zapisywania toku myślenia,
- logicznego wnioskowania,
- rozumienia pojęć, a nie opierania się w rozwiązaniu na znanych algorytmach,
- tworzenia prostych modeli matematycznych do zadań praktycznych.

Ważne jest, aby maturzyści uważnie czytali i analizowali treść zadań, a następnie udzielali zwięzłej i precyzyjnej odpowiedzi, zgodnej z przedstawionym poleceniem.